



NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.
ul. Belgradzka 3/UH9
02-793 Warszawa
Telefon: 22 - 816 83 33
E-mail: lecznica.natolin@gmail.com
Radiologia Cyfrowa DR
Badania i zabiegi endoskopowe

Zwierzę

ERYS

Gatunek: KOT

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samiec

Wiek: tygodni: 22

Oznakowanie:

Maść: typowa ;)

Właściciel

Karta informacyjna leczenia

04/03/2020 22:34: BADANIE

OPIS BADANIA

Bł. śluzowe różowe, wilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchowo brak szmerów sercowych, szmery oddechowe prawidłowe, tętno zgodne z rytmem serca, dobrze wyczuwalne, ok. 100/min.

premedykacja: dexdomitor, comfortan, ketamina
indukcja znieczulenia: propofol,
intubacja rurką dotchawiczą
preoksygenacja
podtrzymanie znieczulenia: znieczulenie w ziewne izofluranowe
analgezja przedoperacyjna: melovem,
analgezja śródoperacyjna: fentanyl CRI
analgezja pooperacyjna: bunondol

Przebieg znieczulenia rutynowy i płynoterapia krystaloidy 5 ml/kg/h. Parametry życiowe podczas znieczulenia w zakresie norm. Dogrzewanie pacjenta w trakcie i po zabiegu.
Wybudzanie spontaniczne.

ZABIEGI

OSTEOSYNTeza S

Złamanie skośne trzonu kości udowej. Osteosynteza prawej kości udowej.

Do zabiegu zastosowano płytę AO w systemie 2.0 mocowaną 5 wkrętami i potrójny cerklarz drutem ortopedycznym 0,6 mm.

ZASTOSOWANE LEKI

Dexdomitor 0,5mg/ml	0,1	ml
COMFORTAN 10 MG/ML 10 ML	0,1	ml
Bioketan 10%	0,1	ml
Melovem 100ml	0,1	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
Synulox inj. /100 ML, inj.	0,2	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
GABAPENTIN TEVA 100MG KAPS. 100SZT.	0,1	OP
Antisedan	0,1	ml
Inj. Solutio Ringeri 500ML	1	sztuka
KOŁNIERZ POOPERACYJNY 7,5 cm	1	sztuka

ZALECENIA

- zwierzę po zabiegu powinno przebywać w cichym, spokojnym miejscu najlepiej na poziomie podłogi
- pierwszy posiłek wskazany jest dopiero na drugi dzień po zabiegu
- pić może 2h po zabiegu, początkowo woda jedynie na dnie miski
- zwierzę po zabiegu może chwiejnie chodzić i w okalizować - jest to spowodowane lekami podawanymi podczas znieczulenia
- proszę o znaczne ograniczenie aktywności ruchowej przez najbliższe kilka dni

Historia wizyt


- ochrona rany w postaci kołnierza lub ubranka do zdjęcia szwów (10 dni, decyzja lekarza)
- prosimy o niepodawanie żadnych leków przeciwbólowych bez konsultacji z lekarzem (z wyjątkiem tych wydanych przez lekarza)
- prosimy nie zapominać o koniecznych wizytach kontrolnych zaleconych przez lekarza
- w razie jakichkolwiek pytań lub pojawienia się niepokojących objawów prosimy o pilny kontakt z lecznicą

ANALGEZJA POOPERACYJNA

- bunondol 0,1 ml na śluzówki co 6h (4, 10, 16, 22), przez 2 doby od zabiegu
- meloksykam 7-8 dni 1x dziennie
- gabapentyna 1/2 kaps 2x dziennie (kapsułkę należy otworzyć i połowę zawartości kapsułki podać do pyska)

- antybiotykoterapia do 5 dni po zabiegu

Po 5 tygodniach kontrolne zdjęcie RTG. Zabieg usunięcia w szczepów po około 10 tygodniach po zabiegu.

 Zarejestrowała: RODO

05/03/2020 20:41: WIZYTA

ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia

C.d. stan dobry - mało pije i zjadała- obarcza operowaną kończynę, niewielki obrzęk

Kolejne wizyty do poniedziałku włącznie,

ZASTOSOWANE LEKI

Synulox inj. /100 ML, inj. 0,1 ml


Sposób podania: Iniekcja podskórna

Dawkowanie: do poniedziałku włącznie .

Melovem 100ml 0,05 ml

Sposób podania: Iniekcja podskórna

Dawkowanie: do poniedziałku włącznie .

 Zarejestrowała: RODO

Podpis lekarza weterynarii