



Animal Center
ul. Zamiany 12
02-786 Warszawa
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

ANIMAL CENTER

Zwierzę

Paput

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłósy

Płeć: samiec

Wiek: 1 rok i 3 miesiące

Oznakowanie:

Maść: bura

Właściciel

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Karta informacyjna wizyty

27/06/2019 19:16: BADANIE

Temperatura: 38,8°C

Waga: 4,36 kg



OPIS WYWIADU

Bez poprawy, nadal obniżona aktywność, nie ma apetytu, nie korzystał z kwater

Na nagrany przez Opiekunkę filmie Paput porusza się ostrożnie, na zgętych kończynach, przyjmuje pozycje bólowe

Większość dnia leży zwinęty w kłębek

Oblizuje się



OPIS BADANIA

błony śluzowe różowe, wilgotne, czas kapilarny w normie, zaczerwienione dziąsła

spojówki rozpalnione, zaczerwienione

powiększone węzły chłonne żuchwowe, pozostałe bez zmian

osłuchowo tachykardia, bez patologicznych szmerów

jama brzuszna miękka, bez wyraźnej bolesności, niepokój w trakcie badania przodo brzucha

przy ucisku kręgosłupa w odcinku lędźwiowym zdecydowany sprzeciw, syczenie

fałd skóry o nieznacznie zmniejszonej elastyczności



ZABIEGI

kontynuacja leczenia

Kroplówka w czasie wizyty

POBRANIE KRWI

RTG



ZASTOSOWANE LEKI

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

CERENIA inj 0,4 ML

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOZ 25MG/ML5SZT 2 ML 1 szt.

Bunondol inj. 0,3mg/1ml 1 amp

Inne materiały 1 szt.

APARAT TYPIS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.

TEST VETEXPERT FIV/FELV 1 szt.

FIV wynik NEGATYWNY

FeLV wynik NEGATYWNY



ZALECENIA

- w dniu jutrzejszym kontakt w sprawie wyników badania krwi

- Bunondol (lek przeciw bólowy) dwa razy dziennie na błony śluzowe jamy ustnej

- niewielki posiłek podajemy dwie godziny po wizycie

Historia wizyt

- badanie USG jamy brzusznej w najbliższy poniedziałek o godzinie 18.30 (Paput musi być 8-10 h na czczo)
- w przypadku braku poprawy lub pogorszenia wizyta w dniu jutrzejszym
- dalsze zalecenia w zależności od wyników badań dodatkowych

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii



Animal Center
ul. Zamiany 12
02-786 Warszawa
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

Zwierzę

Paput

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samiec

Wiek: 1 rok i 4 miesiące

Oznakowanie:

Maść: bura

Właściciel

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Historia wizyt

01/07/2019 18:43: BADANIE

OPIS BADANIA

nerki niepowiększone, o prawidłowym położeniu, zachowanie stosunku kora/rdzeń, miedniczki bez cech zastój, początkowe odcinki moczowodów bez zmian, nadnercza bez zmian w budowie, pęcherz moczowy wypełniony niewielką ilością moczu klarownego sonograficznie, ściana prawidłowa, wątroba niepowiększona, delikatnie niejednorodnej echogeniczności, bez zmian ogniskowych w miększu, układ naczyń i prawidłowy, pęcherzyk żółciowy wypełniony echogenną żółcią, ściana prawidłowa, drogi żółciowe prawidłowe, śledziona niepowiększona, normoechogeniczna, żołądek z płynną zawartością, o nieco wzmocnionym pofałdowaniu ściany, zgaszone przyściennie, ściana na widocznych obszarach zachowanie w warstwach ości, perystaltyka wzmożona trzustka o niejednorodnej, raczej obniżonej echogeniczności, o nieregularnym obrysie, jak pozapalna/zapalna, średnicy w zakresie 6-8mm, w okolicy, przyśledzionowo obecny pojedynczy, zmieniony zapalnie węzeł chłonny, średnicy 5mm, niewielki odczyn zapalny w okolicy, dwunastnica, jelito czcze, biodrowe o zachowaniu układzie warstwowym, prawidłowej perystaltyce, próżne, odcinkowo, w przedniej części narządu widoczne wzmocnione pofałdowanie ściany, w okrężnicy zbita treść, zgaszone przyściennie, ściana bez cech zapalnych w węzłach chłonnych na terenie jamy brzusznej niepowiększone, bez wolego płynu na terenie otrzewnej

ZABIEGI

USG jamy brzusznej

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

01/07/2019 18:55: BADANIE

Temperatura: 38,0°C

Waga: 4,03 kg

OPIS WYWIADU

Kału formowany.

Czuje się dobrze.

OPIS BADANIA

Miękki, niebolesny brzuch.

Osluchowo nad klatką piersiową bez anomalii.

Lekkie powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych.

Różowe spojówki.

Na usg jamy brzusznej zmieniona trzustka.

 **ZABIEGI**

kontynuacja leczenia
Kroplów ka sc w czasie w izyty

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 200 ml s.c.</i>		
Inne materiały	1	szt
APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ	1	szt.
AMYLA CTIV DIGEST 90 KAPS	0,12	SZT
FLORA DEFENSE 30 KAPS	0,33	szt.

 **ZALECENIA**

- raz dziennie do jedzenia/pyszczka zaw artość kapsułki amylactiv digest i flora balance
- za tydzień na czczo kontrola (morfologia, lipaza)
- jeśli objaw y bólow e proszę podać na błony śluzow e bunondol (naw et co 8 godzin) i w izyta w cześniej

 Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

01/07/2019 19:35: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

w yniki badań kału w karcie Ryszardy

 Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/07/2019 17:57: BADANIE

Waga: 4,1 kg

 **OPIS WYWIADU**

Ogólnie czuje się dobrze.
Wczoraj był trochę mniej aktywny, dostał bunondol i w tedy w ręcz nadaktywny po bunondolu.

 **OPIS BADANIA**

Brzuch niebolesny.
Bez odw odnienia.
Nadal pow iększenie w ęzłów chłonnych podżuchw ow ych.

 **ZABIEGI**

kontynuacja leczenia
POBRANIE KRWI

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Bunondol inj. 0,3mg/1ml	1	amp
<i>Dawkowanie: porcja 0,15</i>		

 **ZALECENIA**

- proszę jutro o telefon w sprawie w yników badań krwi (w tedy decyzja o dalszych zaleceniach i terminie kontrolnego badania usg jamy brzusznej)
- do skończenia raz dziennie do jedzenia/pyszczka zaw artość kapsułki amylactiv digest i flora balance, ew . pow tórzymy
- jeśli objaw y bólow e proszę podać na błony śluzow e bunondol (naw et co 8 godzin) i w izyta w cześniej

Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/07/2019 18:04: WIZYTA

 **ZABIEGI**

VETLAB -LIPAZA
VETLAB -MORFOLOGIA MASZYNOWA

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

09/07/2019 08:17: BADANIE

 **OPIS BADANIA**

Lipaza spadła.
Bez leukocytozy.

 **ZALECENIA**

- w połowie sierpnia kontrolne badanie usg jamy brzusznej
- do czasu badania raz dziennie do pyszczka/karmy zawartość kapsułki amylactiv digest
- jeśli niepokojące objawy w izyta w cześniej

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

13/07/2019 14:34: BADANIE

Temperatura: 37,8°C
Waga: 4,1 kg

 **OPIS WYWIADU**

Do południa czuł się bardzo dobrze.
Apetyt zachowany. Rano jadł normalnie.
Od południa znowu podobny epizod jak 2 tygodnie temu.
Zaczął chodzić na przykurczonych kończynach. Chował się po kątach, w łazience.
Oddawał kał uformowany.
Bez wymiotów.

W zeszłym roku po kastracji miał incydent drżenia kończyny miednicznej.

 **OPIS BADANIA**

Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone.
Błony śluzowe jasnoróżowe, wilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnoróżowe.
Brzuch miękki, niebolesny.
Osluchowo bez patologicznych szmerów nad sercem i drogami oddechowymi.

Bolesność w okolicy lędźwiowej L4-5-6.
Również bolesność stawów biodrowych.

 **ZABIEGI**

kontynuacja leczenia

 **ZASTOSOWANE LEKI**

LOXICOM 5MG	0,15	ml.
Inne materiały	1	szt
LOXICOM 0,5MG 15ML/ZAWIES.	0,5	ml
Polprazol 20mg kaps. 28szt	1	szt.
CERENIA inj	0,2	ML

 **ZALECENIA**

- dzisiaj w miarę możliwości ograniczenie ruchu (nie pozwalamy w skakaniu i zeskakiwaniu).

Historia wizyt

- jutro podajemy do pysia Loxicom (syrop doustny) 1 porcja 1 x dziennie - PO jedzeniu! - w razie wymiotów , biegunek, braku apetytu odstawiamy i kontakt z lecznicą.
- osłonowo na przewód pokarmowy Polprazol 20 mg 1/2 kapsułka 1 x dziennie - 30 minut przed jedzeniem!
- w poniedziałek kontrolna wizyta.

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

15/07/2019 17:45: BADANIE

Temperatura: 38,6°C
Waga: 4,1 kg

OPIS WYWIADU

Raczej bez poprawy, choć próbowała w skakaniu.
Od dwóch dni bez defekacji.
Apetyt i samopoczucie dobre.

OPIS BADANIA

W lecznicy poruszyła się sprawnie, w skoczyła bez problemu z podłogi na stół.
W zatokach przydbytowych minimalna ilość wydzieliny.
Obustronnie powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych.
Miękki, niebolesny brzuch, wyczuwalne masy kałowe w prostnicy.
Bolesne obustronnie stawy biodrowe.

ZABIEGI

kontynuacja leczenia

ZASTOSOWANE LEKI

Gabapentin Teva 100mg. na szt. 3 szt.

ZALECENIA

- ograniczenie ruchu
- konsultacja ortopedyczna
- dwa razy dziennie 1/10 kapsułki gabapentin 100 mg do pyszcza

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

21/07/2019 11:15: BADANIE

Temperatura: 38,0°C
Waga: 4,09 kg

OPIS WYWIADU

Od godziny znów u problemu z chodzeniem - porusza się, ale jakby się czaił.
Poza tym samopoczucie dobre, apetyt dzisiaj zachowany.
Nie wymiotowała, nie mlaszcze, kał oddaje prawidłowo uformowany.
Pani podała dzisiaj przed 10tą bunondol.
Dzisiaj rano podano gabapentynę.
Pani zapisana jest na 13.08 do ortopedy

OPIS BADANIA

Blony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, CRT <2s. Osad nazębny, zapalenie dziąseł.
Sporządki różowe, węzły chłonne podżuchwowe powiększone, podkolanowe bez zmian.
Krtani i tchawicą niereaktywne.
Osluchanie bez zmian.
Jama brzuszna miękka, niebolesna.
korektura w obu w wszystkich kończynach przednich i tylnych w normie, oczośluzowa fizjologiczna w normie.
kk bez bolesności w badaniu, wyraźne tkliwe/bolesne odcinki łędźwiowe i kręgosłupa (na zdjęciu wykonywanych ok 1 miesiąc temu - bez zmian)
W ruchu po gabinecie obręcz miedniczna zdecydowanie niżej ustawiona - chodzi lekko przyczajony.

ZABIEGI

Kontynuacja niedziela i święta

ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały	1	szt
LOXICOM 5MG	0,15	ml.
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML	1	szt.
LOXICOM 1,5MG 100ML /ZAWIESINA	0,8	ml
Polprazol 20mg kaps. 28szt	1	szt.

ZALECENIA

- dzisiaj w miarę możliwości ograniczenie ruchu (nie pozwalamy w skakaniu i zeskakiwaniu).
- jutro i pojutrze podajemy do pysia Loxicom (syrop doustny) 1 porcja 1 x dziennie - PO jedzeniu! - w razie wymiotów, biegunk, braku apetytu odstawiamy i kontakt z lecznicą.
- osłonowo na przewód pokarmowy Polprazol 20 mg 1/2 kapsułka 1 x dziennie - 30 minut przed jedzeniem!
- Wizyta kontrolna zależnie od samopoczucia.
- w czwartek o godzinie 18.00 konsultacja neurologiczna
- Proszę o próbę ustalenia w wcześniejszym terminu konsultacji ortopedycznej.

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

22/07/2019 09:21: BADANIE

Temperatura: 38,0°C
Waga: 4,18 kg

OPIS WYWIADU

Dzisiaj w nocy bardzo intensywne na biegunkę
Chodzi lepiej, ale widać, że coś mu dolega i cały czas się obliżuje.
Na nagranych przez Panią filmikach chodzi przy ziemi, nie widać zaburzeń równowagi.
Od końca maja pierwszy raz objawy, później było ok, a teraz tydzień temu znowu to samo.
Wczoraj zjadł normalnie po powrocie z lecznicy
później w wieczorem jeszcze troszkę zjadł
Wymiotów nie było

gabapentin 1/10 kaps x 2 dziennie
Bunondol dostaje doraźnie, wczoraj dostał tuż przed wizytą
Dostaje amylactiv, betaglukan

OPIS BADANIA

błony śluzowe różowe, w w. chłonne żuchwowe: lewy powiększony, prawy w normie, osłuchowo w normie, brzuch nieco tkiwy, świadomość normalna zachowanie, w chodzie bez zaburzeń równowagi, jest w stanie wskoczyć z podłogi na stół, bez kulawizny, odruchy z nn czaszkowych bez deficytów, bez oczopląsu patologicznego, w ywołanego, karkatura w normie w k. piersiowych, w miednicznych w normie, taczowanie w normie, przy pozycjonowaniu lekko opóźniona k miedniczną prawą, przy podskakiwaniu także, spina się przy badaniu stawów biodrowych, przeczulica odc kręgosłupa L-S, odruchy rdzeniowe w k. piersiowych w normie, w miednicznych wzmoczone nieznacznie

lokalizacja neuroanatomiczna: L-S
diagnostyka różnicowa: problem bólowy kręgosłupa lub ból ortopedyczny (do weryfikacji u ortedy) do różnicowania z chorobą trzustki

ZABIEGI

Konsultacja specjalistyczna 1,5
konsultacja neurologiczna

ZASTOSOWANE LEKI

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 1 AMP.

Historia wizyt

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML	1	szt.
CERENIA inj	0,4	ML
Inne materiały	1	szt
APTUS ATTAPECTIN an TABI	4	tabl
Bunondol inj. 0,3mg/1ml	1	amp



ZALECENIA

- Gabapentin jak wcześniej
- Attapectin 1 tabletkę x2 dziennie doustnie (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol doraźnie w przypadku gorszego samopoczucia
- kontrolne badanie USG jamy brzusznej 12h na czczo
- w dalszej kolejności badanie krwi i kontrolne (min morfologia, lipaza)
- do czasu konsultacji ortopedycznej laseroterapia odcinka L-S (minimum 10 spotkań, ok 2-3 razy w tygodniu)
- kontrolna wizyta po badaniu USG
- w przypadku niepokojących objawów wizyta wcześniej



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

23/07/2019 11:59: BADANIE

Temperatura: 37,0°C
Waga: 4,08 kg



OPIS WYWIADU

W nocy i rano bardzo intensywna biegunka - oddał mocz w kuwecie, a następnie wyskoczył z kuwety i biegając po mieszkaniu oddawał kał. Kał konsystencji budyniu, cuchnący.
Rano zjadł niewielką porcję karmy, nie chce pić wody.
Attapectin wczoraj o 15:00, dziś o 8.
Gabapentyna i Amlactiv o 8.
Bunondolu nie dostawał, bo nie chodzi na przygiętych łapach. Ale sporo poleguje.

Jutro umówione USG.



OPIS BADANIA

Błony śluzowe jasnoróżowe, lepkie, CRT < 2s. Spojówki różowe.
Węzły chłonne żuchwowe powiększone, podkolanowe.
Brzuch miękki, bolesność w przedbrzuszu, zgasowana pętla jelit.
Osluchanie bez patologicznych szmerów sercowych i oddechowych.



ZABIEGI

kontynuacja leczenia
Kroplówka i.v.
Założenie w enflonu



ZASTOSOWANE LEKI

Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 160ml powolny wlew dożylny</i>		
WLEWNIK	1	szt.
Inne materiały	1	szt
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.
<i>podana o 12:30</i>		
Omeprazol Mylan amp 40 mg, proszek, amp 0,2		amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg i.v.</i>		
CERENIA inj	0,4	ML
Vit. B12	1	amp
WENFLON NIEBIESKI	1	szt.

ZALECENIA

Historia wizyt

- jutro 10 godzin na czczo przed USG, w odę może pić
- w zależności od samopoczucia jutro ewentualnie w wykonanie dodatków o badania krwi
- Gabapentin jak wcześniej
- Attapectin 1 tabletki x2 dziennie doustnie (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzowe jamy ustnej (następne podanie dziś w wieczorem)
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie poprawie

 Zarejestrowań: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

23/07/2019 22:14: BADANIE

OPIS WYWIADU

W lecznicy popołudniu samopoczucie bez zmian - niezainteresowany jedzeniem.
Wieczorem o 22 podaję bunondol i nospę
Paput zostaje do jutra, jutro o 15.30 USG

ZABIEGI

Zastrzyk l.m. l.s.
nospa
Pobyt dzienny 10,8

ZASTOSOWANE LEKI

Bunondol inj. 0,3mg/1ml 1 amp

 Zarejestrowań: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

24/07/2019 08:34: BADANIE

Temperatura: 39,0°C

OPIS WYWIADU

Po nocy bez kału w kłucie.
Oddał mocz.
Nie chciał jeść.

Rozgryzł sobie w enflon - niedrożny (zdejmuje i zakłada nowy).
Pobrano krew - wysyłam na profil przesiewowy i lipazę.
Do godziny 14.30 nie oddał kału w lecznicy.

Po kontrolnym USG decyzja o wdrożeniu antybiotyku - Synergalu.

OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe lekko powiększone, podkolanowe w normie.
Błony śluzowe jasnoróżowe, lepkie. CRT <2sek.
Splotki jasnoróżowe, rozpalnione. Wypływ z obu oczu, ciemnobrązowy.
Brzuch miękki, niewielka tkliwość w przedbrzuszu.
Osluchowo bez patologii.

ZABIEGI

kontynuacja leczenia
Kroplówka i.v.
Założenie w enflonu

ZASTOSOWANE LEKI

WLEWNIK 1 szt.
Inne materiały 1 szt.
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2 amp
Dawkowanie: 1mg/kg i.v.

Historia wizyt

WENFLON NIEBIESKI	1	szt.
TOLFINE / 100 ML INJ.	1	ML
Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1	1	szt.
Zofran 2MG/ml AMP	1	ml
SYNERGAL INIEKCJA / 50ML	0,2	ML

ZALECENIA

- jutro w izyta kontrolna z Paputem.
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletki x2 dziennie doustnie (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzowe jamy ustnej (następne podanie dziś w wieczorem)
- sugerowana monodieta.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie poprawie

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

24/07/2019 14:21: WIZYTA

ZABIEGI

Vetlab - profil dla fundacji
VETLAB -LIPAZA

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

24/07/2019 14:37: BADANIE

OPIS BADANIA

nerki niepowiększone, o zachowanym stosunku kora/rdzeń, miedniczki bez cech zastojów, początkowe odcinki moczowodów bez zmian, nadnercza bez zmian w budowie, pęcherz moczowy wypełniony niewielką ilością moczu klarownego sonograficznie, ściana prawidłowa, wątroba niepowiększona, ew. nieco obniżonej echogeniczności, bez zmian ogniskowych w miększu, układ naczyńowy prawidłowy, pęcherzyk żółciowy wypełniony eechogenną żółcią, ściana delikatnie hiperechogenna, drogi żółciowe prawidłowe, śledziona niepowiększona, normoechogeniczna, żołądek niewielką ilością treści pokarmowej, o nieco wzmocnionym pofałdowaniu ściany, zgaszonym przyściennym, ściana na widocznych obszarach o zachowanej w warstwach ości, perystaltyka raczej wzmożona, trzustka o niejednorodnej, zwłaszcza obszarowo obniżonej echogeniczności, o nieregularnym obrysie, przewłok zapalny z zaostreniem, nieco pogrubiała w zakresie 7-8,5mm, niewielki odczyn zapalny w okolicy, z tendencją do rozlewania się międzyprzewłokowo, dwunastnica, jelito czciste, biodrowe o zachowanym układzie warstwowym, prawidłowej perystaltyce, w przewodzie próżnym, odcinkowo, w przedniej części narządu widoczne wzmocnione pofałdowanie ściany, w okrężnicy mała ilość uformowanej treści, zgaszonym przyściennym, ściana bez cech zapalnych pojedynczo w wchłonnej jamy brzusznej o zmiennej echogeniczności, nieco niejednorodnej, w przewodzie obniżonej, pojedynczo kręzka śledzionowej, też w okolicy ujścia biodrowego, zapalne przewłoki, bez wolnego płynu na terenie jamy otrzewnej

ZABIEGI

USG jamy brzusznej

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

25/07/2019 13:38: BADANIE

Temperatura: 38,0°C
Waga: 4,1 kg

OPIS WYWIADU

Od rana samopoczucie dobre, apetyt zachowany.
Rano zjadł śniadanie ok 8 i wszystko było w porządku - nie mlaskał, nie ślinił się, bardziej aktywny - przemieszcza się po mieszkaniu.
O 12.30 podano amylactiv - po podaniu amylactivu w wymiotował, Pani odczekała ok 30min i znowu podała lek - ponownie w wymioty. Łącznie

Historia wizyt

zw rócił w szystko co dziś zjadł.
Dziś nie dostał żadnych innych leków, bez podaży bunondolu.
Oddał mocz dw ukrotnie, od w torku bez defekacji.



OPIS BADANIA

Błony śluzow e jamy ustnej różow e, w ilgotne, crt <2s
Spojów ki lekko zaczerw ienione i rozpulchnione, bez w ypywu przy w orkach spojów kow ych.
Krtąń i tchaw ica niereaktyw ne.
Węzły chłonne podżuchw ow e pow iększone, podkolanow e bez zmian.
Jama brzuszna miękka, niebolesna, w yczuw alne znacznie pogrubiałe pętle jelit.
W prostrnicy w yczuw alna niew ielka ilość uformow anego kału.
Denerw uje się przy omacyw aniu brzucha w okolicy lędźw iow ej - przy ucisku blisko kręgosłupa.
Wenflon drożny.
O 14.15 podano bunondol na błony śluzow e.
o 15.30 w staw iono miseczkę z jedzeniem - siedzi zestresow any w klatce , na razie niezainterosow any jedzeniem.
Bez w ymiotów od czasu przyw iezienia do przychodni.



ZABIEGI

kontynuacja leczenia 0,8
Kroplów ka i.v.



ZASTOSOWANE LEKI

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML	0,2	ML
WLEWNIK	1	szt.
Inne materiały	1	szt
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2	amp	
<i>Dawkowanie: 1mg/kg i.v.</i>		
CERENIA inj	0,4	ML
CATOSAL / 10% INJ. 100,L	1	ML
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 170 ml</i>		
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.



ZALECENIA

- jutro w izyta kontrolna z Paputem - do ustalenia z Panią czy Paput nie zostaje u nas już od dziś, jeśli tak to proszę o dow iezienie karmy z cielęcina .
- *w dniu jutrzejszym kontynuacja płynoterapii dożylniej ,antybiotykoterapia, inne leki w g stanu
- Gabapentin jak w cześniej
- Attapectin 1 tabletkę x2 dziennie doustnie w razie luźnej konsystencji kału (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej -> kolejne podanie dziś o 22
- sugerow ana monodieta - na razie próba z karma bazującą na cielęcinie.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie popraw ie



Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

26/07/2019 07:45: BADANIE

Temperatura: 37,9°C



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze.
Nie chce za bardzo jeść w lecznicy.
Oddał uformow any kał do kuw ety. Oddał mocz.
Bez w ymiotów po nocy.



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchw ow e lekko pow iększone, podkolanow e niepow iększone.
Błony śluzow e jasnoróżow e, w ilgotne. CRT <2sek.
Spojów ki jasnoróżow e.
Brzuch miękki, niew ielka tkliw ość w przodobrzuszu.

Historia wizyt

Osluchow o bez patologii nad drogami oddechow ymi i sercem.

ZABIEGI

kontynuacja leczenia 0,8
Kroplów ka i.v.
Pobyt DOBA 0,8

ZASTOSOWANE LEKI

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML	0,2	ML
WLEWNIK	1	szt.
Inne materiały	1	szt
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2		amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg i.v.</i>		
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 170 ml</i>		
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.
Zofran 2MG/ml AMP	1	ml

ZALECENIA

- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Gabapentin jak w cześciej
- Attapectin 1 tabletki x2 dziennie doustnie w razie luźnej konsystencji kału (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzow e jamy ustnej -> kolejne podanie dziś o 22
- sugerow ana monodieta - na razie próba z karma bazującą na cielęcinie.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie poprawie

 Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

27/07/2019 13:43: BADANIE

Temperatura: 37,6°C

OPIS WYWIADU

Czuje się bardzo dobrze, lubi głaskanie.
Apetyt zachow any, choć z trudem w chodzi mu karma Gusto (po w ymieszaniu z sosem Miamora i mokrym Gastrointestinal Low Fat zjada).
Nie oddał kału, nie w ymiotow ał, oddał mocz.

OPIS BADANIA

Błony śluzow e jasnoróżow e, w ilgotne, CRT<2s. Spojów ki różow e.
Węzły chłonne obw odow e niepow iększone.
Brzuch miękki, niebolesny.
Osluchow o bez patologicznych szmerów sercow ych i oddechow ych.

ZABIEGI

Pobyt DOBA 0,8
kontynuacja leczenia 0,8
Kroplów ka i.v.

ZASTOSOWANE LEKI

Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2		amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg i.v.</i>		
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 170 ml</i>		
SYNERGAL INIEKCJA / 50ML	0,2	ML
WLEWNIK	1	szt.
Inne materiały	1	szt
Zofran 2MG/ml AMP	1	ml
Gabapentin Teva 100mg. na szt.	1	szt.

ZALECENIA

- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Gabapentin jak w czeńniej
- Attapectin 1 tabletki x2 dziennie doustnie w razie luźnej konsystencji kału (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzowe jamy ustnej -> kolejne podanie dziś o 22
- sugerowana monodieta - na razie próba z karmą bazującą na cielęciny.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie poprawie

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

28/07/2019 09:52: BADANIE

Temperatura: 38,2°C

OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze.
Apetyt zmniejszony, choć interesuje się jedzeniem.
W nocy oddał sporą ilość moczu, bez defekacji.

OPIS BADANIA

Błony śluzowe różowe, wilgotne, CRT<2s. Spójwka oka prawego różowa, lewego różowa, lekko rozpulchniona.
Węzły chłonne obwodowe niepowiększone (lekko powiększony węzeł szyjny).
Brzuch miękki, niewielka tkliwość w przedbrzuszu, wyczuwalne wprostnicy uformowane masy kałowe.
Osluchowo bez patologicznych szmerów sercowych i oddechowych.
Fałd skóry elastyczny.

ZABIEGI

Pobyt DOBA 0,8
Kontynuacja niedziela i święta 0,8

ZASTOSOWANE LEKI

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML	0,2	ML
Inne materiały	1	szt

ZALECENIA

- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Gabapentin jak w czeńniej
- Attapectin 1 tabletki x2 dziennie doustnie w razie luźnej konsystencji kału (minimum 2h od jedzenia i innych leków doustnych)
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzowe jamy ustnej
- sugerowana monodieta - na razie próba z karmą bazującą na cielęciny.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie poprawie

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

29/07/2019 14:10: BADANIE

Temperatura: 38,1°C
Waga: 3,89 kg

OPIS WYWIADU

Samopoczucie dobre, chętnie się mizia.
Po nocy wkuwanie bez kału.
Nie zjadł śniadania.

OPIS BADANIA

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, CRT <2s
Spojówki lekko zaczerwienione, wężły chłonne podzuchwowe powiększone, podkolanowe bez zmian.
Krtani i tchawica niereaktywne.
Osluchowo bez zmian.
Jama brzuszna miękka, choć wyraźnie tkliwa.
O 13.30 podano bunondol.

ZABIEGI

Pobyt DOBA 0,8
kontynuacja leczenia 0,8

ZASTOSOWANE LEKI

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML	0,2	ML
Inne materiały	1	szt
SYNERGAL TABL 50MG. NA SZT.	14	szt.
FLORA BALANCE listek	1	listek

ZALECENIA

- Synergal 50 mg (antybiotyk) 1 tabl co 12h -> kolejne podanie jutro rano.
- Flora balance (probiotyk) 1/2 kaps 1xdz, proszę o zachowanie min2h odstępu od podania antybiotyku.
- Jeśli samopoczucie w domu dobre, to wizyta kontrolna za tydzień w poniedziałek.
- Gabapentin jak wcześniej
- Bunondol 2 x dziennie na błony śluzowe jamy ustnej
- sugerowana monodieta - na razie próba z karmą bazującą na cielęciny.
- laseroterapię przekładamy do czasu, kiedy samopoczucie ulegnie poprawie

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

29/07/2019 20:49: BADANIE

OPIS WYWIADU

Rozmowa tel.
Paput po pół godziny od powrotu do domu - miał znów te same objawy.
Chodzi na przykurczonych nogach, ciągle leży.
Po podaniu Bunondolu trochę lepiej.

Jeśli będzie poprawa Pani jutro przyjdzie po Bunondol (ew. receptę)
W środę wizyta

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

31/07/2019 11:40: WIZYTA

ZABIEGI

Wydanie recepty
Bunondol 5amp.

ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały	1	szt
insulinówki		

ZALECENIA

- Bunondol 0,15ml (6 kreseczek w strzykawce insulinowej) na błony śluzowe jamy ustnej 2 x dziennie doraźnie

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

05/08/2019 19:56: BADANIE

Temperatura: 38,7°C
Waga: 4,07 kg

 **OPIS WYWIADU**

W sobotę w wieczorem rozluźniony kał, potem bez defekacji.
Ale przed sobotą nowa karma.
Doraźnie bunondol po objawy bólowe z grzbietu, złe chodzeniem.
Dobry apetyt.
Niestety do ortopedy zapisany dopiero na 13 sierpnia.

 **OPIS BADANIA**

Odwodnienie około 7%.
Różowe spojówki.
Osad nazębny.
Miękki brzuch, w okolicy w trakcie badania ale niezależnie od miejsca omacywania brzucha łapek - prawdopodobnie ze zdenerwowania.
Ewentualnie manifestuje objawy bólowe kręgosłupa odcinka lędźwiowego o-krzyżowego.
Diagnoza: zapalenie trzustki, bolesność kręgosłupa

 **ZABIEGI**

kontynuacja leczenia 0,8
Kroplówka w czasie wizyty

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Inne materiały	1	szt
SYNERGAL TABL 50MG. NA SZT.	14	szt.
Sol 250 ml NaCl	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150</i>		
Vit. B12	1	amp

 **ZALECENIA**

- nadal antybiotyk synergal 50 mg 1 tabl. co 12 godzin
- raz dziennie fortiflora
- co drugi dzień 150 ml NaCl podskórnie (śr., pt. i niedz/pon.)
- gabapentin jak wcześniej
- bunondol przy objawach bólowych
- amylactiv
- wstępnie za 3 tygodnie usg jamy brzusznej na czczo

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii