



NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.

ul. Belgradzka 3/UH9
02-793 Warszawa
Telefon: 22 - 816 83 33
E-mail: lecznica.natolin@gmail.com
Radiologia Cyfrowa DR
Badania i zabiegi endoskopowe

Zwierzę

Sony

Gatunek: PIES
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samiec
Wiek: 14 lat i 10 miesięcy
Oznakowanie:
Maść: czarna podpalana
Waga: 12 kg

Właściciel

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Karta informacyjna wizyty

23/10/2019 19:57: BADANIE

OPIS WYWIADU

w znieczuleniu ogólnym w wykonano zabieg rekonstrukcji w iezadła krzyzow ego lew ej konczyny miedniczej

OPIS BADANIA

Bł. śluzow e różow e, w ilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchow o szmery sercow e 2/5, szmery oddechow e praw idłow e, tętno zgodne z rytmem serca, dobrze w yczuw alne, ok. 80/min.

premedykacja: dexdomitor low dose, comfortan
indukcja znieczulenia: propofol, ketamina + midanium
intubacja rurką dotchaw iczą
preoksygenacja
podtrzymanie znieczulenia: znieczulenie w ziew ne izofluranow e
analgezja przedoperacyjna: melovem, biovetalgin
analgezja śródoperacyjna: fentanyl bolus + znieczulenie miejscow e
analgezja pooperacyjna: melovem, biovetalgin

Monitoring pacjenta podczas znieczulenia:
HR 90
RR 12
SpO2 98
EtCO2 45
MAP 70
temp. 37,7

Przebieg znieczulenia rutynow y płynoterapia krystaloidy 5 ml/kg/h. Parametry życiow e podczas znieczulenia w zakresie norm. Dogrzew anie pacjenta w trakcie i po zabiegu.

w domu na stałe theovent i gabapetyna

ZABIEGI

Zabieg chirurgiczny

ZASTOSOWANE LEKI

Dexdomitor 0,5mg/ml	0,1	ml
<i>Dawkowanie: 1 mcg/kg</i>		
COMFORTAN 10 MG/ML 10 ML	0,2	ml
Inj. Sol.Ringeri Lactate 500ml	1	sztuka
Inj. Solutio Ringeri 500ML	1	sztuka
Antisedan	0,05	ml

Historia wizyt

Bioketan 10%	0,3	ml
Melovem 100ml	0,4	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
Biovetalgin/ 100ml inj.	1,2	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
Synulox inj. /100 ML, inj.	0,8	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
PYRALGINUM 500MG 20X TABL.	2	szt.
<i>Dawkowanie: rano i wieczorem jutro</i>		
<i>wasciciel nie moze przyjsc na wizyte kontrolna</i>		
Rheumocam 1 mg tabl	1	sztuka
Clavubactin 250/62.5 tabl.	2	tabletki
<i>Dawkowanie: 3/4 tabl jutro 2x</i>		
Fortiflora dog	1	sztuka
Adrenalinum INJ.0.1% 1MG/1ML	1	sztuka
LIGNOCA INUM H/CHLOR. 2%/2ml	1	sztuka



ZALECENIA

- zwierzę po zabiegu powinno przebywać w cichym, spokojnym miejscu najlepiej na poziomie podłogi
- pierwszy posiłek wskazany jest dopiero na drugi dzień po zabiegu
- pić może 2h po zabiegu, początkowo woda jedynie na dnie miski
- zwierzę po zabiegu może chwiejnie chodzić i w okalizować - jest to spowodowane lekami podawanymi podczas znieczulenia
- proszę o ograniczenie aktywności ruchowej przez najbliższe kilka dni, w skazane zimne okłady w okolicy rany pooperacyjnej
- ochrona rany w postaci kołnierza
- prosimy o niepodawanie żadnych leków przeciwbólowych bez konsultacji z lekarzem (z wyjątkiem tych wydanych przez lekarza)
- prosimy nie zapominać o koniecznych wizytach kontrolnych zaleconych przez lekarza
- w razie jakichkolwiek pytań lub pojawienia się niepokojących objawów prosimy o pilny kontakt z lecznicą



Zarejestrować: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii