



Klinika Weterynaryjna New Vet 24h

ul. Chwaszczyńska 22, I.5

81-571 Gdynia

Telefon: 790 454 500, 58 620 00 37

E-mail: kontakt@newvet24h.pl, recepcja@newvet24h.pl

Zwierzę

Stasiu

Gatunek: Kot

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 10 lat i 11 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: czarna

Właściciel

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Historia wizyt

26/10/2018 13:04: BADANIE

Temperatura: 38,1°C

Waga: 5,37 kg

OPIS WYWIADU

Stanisław od dłuższego czasu boryka się z plazmocytarnym zapaleniem przyzębia. Przeszedł zabieg usunięcia części zębów, bez poprawy.

Od dłuższego czasu otrzymuje iniekcję z glikokortykosteroidów, pomaga na około 2 tygodnie po czym jest nawrót. Ostatnia iniekcja wczoraj.

Kot miewa napady bardzo silnego bólu, przestaje przyjmować karmę, nie pozwala się dotykać.

Żywiony musem Gourmet, rozartym na płynną papkę.

Kot jest FIV dodatni.

Właścicielka dostarczyła wyniki badań krwi kota wykonane wczoraj- bez istotnych odchyień od normy.

OPIS BADANIA

Nie ma możliwości zbadania jamy ustnej ze względu na silną bolesność, wyczuwalny fetor ex ore.

Węzły chłonne dostępne do badania nie bolesne, HR 160, brzuch miękkie, nie bolesny, wyczuwalne wypełnione jelita.

Zdecydowano o pozostawieniu kota w celu dokładnego zbadania jamy ustnej i wykonania zdjęć RTG bez premedykacji.

Dziąsła obrzęknięte, ciemno czerwone, bardzo silny kamień nazębny na zębach trzonowych szczęki, w ruchwie brak zębów.

Wykonano zdjęcia RTG czaszki w 3 projekcjach, brak zmian w kościach, brak pozostawionych korzeni zębowych w żuchwie.

Po znieczuleniu podano dożylnie płyn i buprenorfinę.

Zalecenia do domu:

1. Klimicin 1 iniekcja co 12 h zaczynając od 7 rano.
2. Gabapentin 1/2 tabletki co 8 h, można wysypać zawartość do jedzenia.
3. Kontrola w środę i decyzja co do terminu usunięcia pozostałych zębów.

ZABIEGI

Wizyta I kot, pies

Rtg 3 zdjęcia

Wlew dożylny

ZASTOSOWANE LEKI

PŁYN RINGERA LACTATE 250 ml	1	op
Klimicin, 300 mg/2ml, ampulki	2	amp

Dawkowanie: Podać () kapsułki, () x dziennie, przez () dni, doustnie.

W przypadku wystąpienia wymiotów, biegunki, apatii, braku apetytu lub innych niepokojących objawów wskazany pilny kontakt z lekarzem.

 Lekarz: lek.wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

28/10/2018 09:11: BADANIE

OPIS WYWIADU

Dodałem pdf do wizyty

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

30/10/2018 21:16: BADANIE

 Lekarz: lek.wet. DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

31/10/2018 15:17: BADANIE

OPIS WYWIADU

Stasiu czuje się zdecydowanie lepiej, ma dobry apatyt.
Nie udało się podawać buprenorfiny na błony śluzowe.

OPIS BADANIA

Kot znacznie spokojniejszy, pozwala na badanie jamy ustnej, dziąsła nadal silnie zaczerwienione, mniej obrzęknięte.
Dziś badanie echo serca.

Przedłużam antybiotyk do środy, gabapentynę jeszcze Pani ma w domu.

Podajemy tak jak poprzednio:

-1 iniekcja klindamycyny co 12 h

-1/2 kapsułki gabapentyny co 8h.

W poniedziałek na godzinę 15 proszę przynieść kota na czczo na zabieg usunięcia wszystkich zębów.

ZABIEGI

Wizyta kolejna kot, pies

ZASTOSOWANE LEKI

Klimicin, 300 mg/2ml, ampulki 2 amp

Dawkowanie: Podać () kapsułki, () x dziennie, przez () dni, doustnie.

W przypadku wystąpienia wymiotów, biegunki, apatii, braku apetytu lub innych niepokojących objawów wskazany pilny kontakt z lekarzem.

 Lekarz: lek.wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

31/10/2018 16:07: BADANIE

ZABIEGI

Badanie echokardiograficzne 1

ZALECENIA

do rozliczenia przez dr. echo serca

 Lekarz: dr n wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

31/10/2018 21:31: BADANIE

 Lekarz: dr n wet. DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

05/11/2018 09:12: BADANIE

OPIS WYWIADU

Pani przyprowadziła Stasia na zabieg.

Rano w domu Stasio dostał klimicin 0,2 ml s.c oraz gabapentin 1/2 tabl. p.o (gabapentynę Staś dostawał 2 x dziennie ponieważ w południe nie było możliwości podania)

Czuje się znacznie lepiej, ma świetny apetyt, nadal nie pozwala w domu na dotykanie pyszczka.

 Lekarz: lek.wet. DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

06/11/2018 01:15: BADANIE

OPIS BADANIA

Wykonano zabieg sanacji jamy ustnej. Zęby mocno osadzone, trudne do podważenia - odstąpiono od usunięcia.

Kot wrócił do siebie szybko po zabiegu. Bupaq w ciągu nocy + klindamycyna i gabapentyna do podania znów rano.

ZABIEGI

Hospitalizacja 22.00-8.00

Sanacja jamy ustnej 0,5

Założenie wenflonu

Materiały opatrunkowe <20 kg

ZASTOSOWANE LEKI

Płyn Ringera 250 ml kabi	2	szt.		
PRZYRZĄD DO INFUZJI BEZ IGLY / MARGOMED /	2		*szt	
Propofol 1% 10mg/ml, 5 amp 20 ml	7	ml		
Midanium 5mg/1ml amp	1	ampułka		
Bioketan 100 mg/ml, roztw.do wstrzyk., 50 ml	0,11	ml		
PODKŁAD CHLONNY 60 X 90 CM /10/ SZT.	3		*szt	
PODKŁAD CHLONNY 22G, 40 X 60CM / OP. 30 SZT /	2		*opak	
VENFLON KD-FIX 0,9 G-22 niebieski	2	szt		
Bupaq Multidose, 0,3 mg/ml, roztw.do wstrz., 10 ml	0,7	ml		

 Lekarz: lek.wet. DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

06/11/2018 15:32: BADANIE

OPIS BADANIA

Wydano do domu:

-klimicin po 0,2 ml, 2 x dziennie, podskórnice, przez 10 dni

-Gabapentin 1/2 kapsułki, 2 x dziennie, doustnie

-Lactulosa po 2 ml 2 x dziennie do posiłku.

-Bupaq po 0,4 ml 2 x dziennie na bł śl j ustnej

ZASTOSOWANE LEKI

Klimicin, 300 mg/2m, ampulki 2 amp

Dawkowanie: Podać () kapsułki, () x dziennie, przez () dni, doustnie.

W przypadku wystąpienia wymiotów, biegunki, apatii, braku apetytu lub innych niepokojących objawów wskazany pilny kontakt z lekarzem.

Lactulosum Hasco(Lactulol),(2,5 g/5 ml),syrop,150m 40 ml

Dawkowanie: Podawać () ml płynu, () x dziennie, co dziennie, doustnie, przez () dni.

W przypadku wystąpienia wymiotów, apatii, braku apetytu lub innych niepokojących objawów wskazany pilny kontakt z lekarzem.

Gabapentin 300 mg 10 tabl

Bupaq Multidose, 0,3 mg/ml, roztw.do wstrz., 10 ml 3 ml

 Lekarz: lek.wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

15/11/2018 13:58: BADANIE

OPIS WYWIADU

Stasiu czuje się świetnie, ma dobry apatyt, pozwala sobie wycierać buźkę.

OPIS BADANIA

Dziąsła już nie obrzęknięte, różowe, znacznie mniejsza bolesność jamy ustnej, osłuchowo nad polami płucnymi bez szmerów patologicznych, szmer sercowy 2/6, brzuch miękki, nie bolesny.

Sierść lśniąca, widać, że kot zaczął dbać o higienę.

W przyszłym tygodniu wizyta u stomatologa, przedłużam gabapentynę.

ZABIEGI

Wizyta kolejna kot, pies

ZASTOSOWANE LEKI

Gabapentin Teva 100 mg, kaps.twarde, 100 szt 10 kapsułka

Dawkowanie: Podać () kapsułki, () x dziennie, przez () dni, doustnie.

W przypadku wystąpienia wymiotów, apatii, braku apetytu lub innych niepokojących objawów wskazany pilny kontakt z lekarzem.

 Lekarz: lek. wet. DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

22/11/2018 12:00: BADANIE I DIAGNOSTYKA

OPIS WYWIADU

Stasiu 2 dni temu przestał jeść, znów płacze, nie pozwala dotykać pyszczka, dziś obudził się w nocy i krzyczał z bólu.

OPIS BADANIA

Kot nie pozwala zbadać jamy ustnej.

Brzuch miękki, nie bolesny, osłuchowo bez szmerów patologicznych nad polami płucnymi, niewielki szmer nad sercem, oddechy 25/min, HR 120, emp. 38,2C

Pobrano krew do badania kontrolnego, podano bupaq dożylnie oraz antybiotyk (convenię) na 2 tygodnie.

W morfologii niewielka leukopenia oraz odwodnienie

Po około 2 h pynoterapii podano w premedykacji medetomidynę z midazolamem.

Znieczulenie podtrzymywano propofolem.

Wykonano toaletę jamy ustnej, widoczne bardzo silne zapalenie szczególnie przy zębach trzonowych szczęki. Jamę ustną przepłukano preparatem z chlorheksydyną i szalwią

Łuki podniebienne ostrzykano osoczem bogatołytkowym, odwirowanym z wcześniej pobranej krwi pacjenta.

Zdecydowano o hospitalizacji kota do jutra wieczora, dołączyłam metronidazol we wlewie dożylnym.

Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Morfologia szpital

Założenie wenflonu

Pobranie krwi w trakcie wizyty lub w szpitalu

Hospitalizacja 15.00-22.00

Wlew dożylny

OSOCZE BOGATOPLYTKOWE OKO

Znieczulenie infuzyjne za godz 0,5

Hospitalizacja 22.00-8.00

ZASTOSOWANE LEKI

Bupaq Multidose, 0,3 mg/ml, roztw.do wstrz., 10 ml 1 ml

Historia wizyt

CONVENIA 10 ML 0,6 ml
 Płyn Ringera 250 ml kabi 1 szt.
 Gabapentin Teva 100 mg, kaps.twarde, 100 szt 1 kapsułka

Dawkowanie: Podać () kapsułki, () x dziennie, przez () dni, doustnie.

W przypadku wystąpienia wymiotów, apatii, braku apetytu lub innych niepokojących objawów wskazany pilny kontakt z lekarzem.

VENFLON KD-FIX 0,9 G-22 niebieski 1 szt

PODKLAD CHLONNY 60 X 90 CM /10/ SZT. 1 *szt

PRZEDŁUZACZ HEIDELBERG, DO SYSTEMOW INFUZYJNYCH 75 1 *szt

Midanium 5mg/1ml amp 1 ampulka

Propofol 1% 10mg/ml, 5 amp 20 ml 2 ml

Metronidazol 0.5% Polpharma,roztw.d/inf,100ml,poj 11 ml












Stomodine Long Period, 50 ml, (psy, koty) 5 ml

Dawkowanie: Nałożyć za pomocą palca lub patyczka kosmetycznego niewielką ilość żelu na dziąsła i wmasować po obu stronach jamy ustnej.

Powtarzać co () dni

 Lekarz: lek.wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Morfologia krwi

Parametr	Wartość	J.m.	Min	Max	
MCV	55,3 fl	(=)	39	52	+ 
MCH	17,4 pg	(=)	13	21	OK 
MCHC	315 g/l	(=)	3000	3800	- 
OB					
Krwinki czerwone (Erytrocyty)	9,12 T/l	(=)	4,6	10	OK 
Hematokryt	50,4 %	(=)	28	49	+ 
Hemoglobina	159 g/l	(=)	93	153	+ 
Krwinki białe (Leukocyty)	4,7 G/l	(=)	5,5	19,5	- 
PLT (Trombocyty)	287 tys./mm ³	(=)	10	514	OK 
Limfocyty	1,8 10 ⁹ /l	(=)	0,8	7	OK 
Monocyty	0,3 x10 ⁹ /l	(=)	0	0,85	OK 
Uwagi	GRAN =2,6 x 10 ⁹ /L				
Eozynofile (Granulocyty)	3,9 %	(=)	2	12	OK 

23/11/2018 12:24: WIZYTA

 ZABIEGI

Hospitalizacja 8.00-15.00

Hospitalizacja 15.00-22.00

 ZASTOSOWANE LEKI

Bupaq Multidose, 0,3 mg/ml, roztw.do wstrz., 10 ml 1,5 ml

Gabapentin Teva 100 mg, kaps.twarde, 100 szt 2 kapsułka

Dawkowanie: Podać () kapsułki, () x dziennie, przez () dni, doustnie.

W przypadku wystąpienia wymiotów, apatii, braku apetytu lub innych niepokojących objawów wskazany pilny kontakt z lekarzem.

Metronidazol 0.5% Polpharma,roztw.d/inf,100ml,poj 22 ml

PODKLAD CHLONNY 22G, 40 X 60CM / OP. 30 SZT / 1 szt

 Lekarz: lek.wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

23/11/2018 15:17: WIZYTA

 ZASTOSOWANE LEKI

Medicare C 395g 1 szt.

Dawkowanie: Podawać () ml co () h, doustnie.

Royal canin convalescence dog/cat 50g 1 saszetka

 Lekarz: lek.wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

23/11/2018 17:19: ROZMOWA TELEFONICZNA

Opis rozmowy:

Pani Dorota przyjedzie w odwiedzinie do Stasia i spróbuje go nakarmić bo Stasiu nie je od 2 dni

 Lekarz: lek.wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

23/11/2018 20:39: INNE ZDARZENIE

Inne zdarzenie:

Staś podjadł trochę convalescenca ze strzykawki (ok.3ml)

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

24/11/2018 09:51: BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Hospitalizacja 22.00-8.00

Hospitalizacja 8.00-15.00

Pobranie krwi w trakcie wizyty lub w szpitalu

Założenie wenflonu

Opatrunek mały

ZASTOSOWANE LEKI

VENFLON KD-FIX 0,9 G-22 niebieski 1 szt

FUJI DRI-CHEM PROFIL OGOLNY/COMPRES (TP,ALB,ALP,GLU,TBI 1 *szt

FUJI DRI-CHEM NA-K-CL ELEKTROLITY (24 SZT) / NA-K-CL 1 *szt

Płyn Ringera 250 ml kabi 1 szt.

Bupaq Multidose, 0,3 mg/ml, roztw.do wstrz., 10 ml 1,5 ml

Gabapentin Teva 100 mg, kaps.twarde, 100 szt 2 kapsułka











Dawkowanie: Podać () kapsułki, () x dziennie, przez () dni, doustnie.

W przypadku wystąpienia wymiotów, apatii, braku apetytu lub innych niepokojących objawów wskazany pilny kontakt z lekarzem.

Metronidazol 0.5% Polpharma,roztw.d/inf,100ml,poj 11 ml

 Lekarz: lek.wet.DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Biochemia krwi

Parametr	Wartość	J.m.		Min	Max	
Albuminy	3,1 g/dl	(=)		2,3	3,5	OK 
ALT (GPT) 37°	65 U/l	(=)		22	84	OK 
TPP (Białko całkowite)	8,8 g/dl	(=)		5,7	7,9	+ 
Bilirubina	0,3 mg/dl	(=)		0,1	0,4	OK 
Chlorki	122 mmol/l	(=)		101,52	118,44	+ 
ALP (Fosfataza zasadowa)	91 U/l	(=)		9	53	+ 
Fosfor	4,8 mg/dl	(=)		2,6	6	OK 
Gamma GT	1 U/l	(=)		1	10	OK 
Glukoza	138 mg/dl	(=)		70,92	147,96	OK 
Kreatynina (CR)	1,5 mg/dl	(=)		0,8	1,8	OK 
Cholesterol	186 mg/dl	(=)		88,847	176,156	+ 