



## Przychodnia Weterynaryjna "DevaVet"

ul. Warszawska 178  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
Telefon: 531311555  
E-mail: devavet@devavet.pl

### Zwierzę

#### Szkal

Gatunek: Pies  
Rasa: Mieszaniec  
Płeć: samiec  
Wiek: 13 lat i 5 miesięcy  
Oznakowanie:  
Maść: czarna podpalana

### Właściciel

**Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierz**  
ul. Kawęczyńska 16 Lok 39  
03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

## Karta informacyjna wizyty

25/01/2019 12:53: BADANIE

### OPIS BADANIA

Wykonano zabieg sanacji i mnogiej ekstrakcji.

Obfity kamień nazębny, przerost dziąsła, silny stan zapalny. Usunięto kamień za pomocą ultradźwięków oraz wyrównano linię dziąsła.

Usunięto:

- wszystkie siekacze żuchwy i szczęki - wszystkie siekacze starte do linii dziąseł, większość ruchome, podstłaniana miazga

- Żuchwa - pierwszy przedtrzonowiec lewej strony, przedtrzonowiec prawy - rozległa próchnica

- Szczeka - ząb wilczy lewy silna ruchomość, ostatni trzonowiec lewy silna ruchomość, pierwszy przedtrzonowiec lewy - rozległa próchnica sięgająca do korzeni

Podano przed zabiegiem lek przeciwbólowy, antybiotyk. W związku z silnym krwawieniem po ekstrakcji podano cyklonaminę. We wlewie antybiotyk, dożylnie lignocainę antyarytmicznie.

RTG - brak zmian świadczących o obecności ropnia

Diagnoza: Sanacja z ekstrakcją

### ZABIEGI

RTG

RTG 1

usunięcie kamienia z ekstrakcją

### ZASTOSOWANE LEKI

Lignocainum h/chlor.(WZF), 2%,20 ml, inj	2	ml
Cepetor inj. 10ml	0,2	ML
Ketamina 10 ml	0,2	1ml.
Butomidol inj. 10ml	0,2	ML
Enrotron ini. 50 mg /100 ml	2	ml
Rycarfa 50mg/ml	1,7	ml
Venflon niebieski	1	SZT.
Wlewnik	1	SZT
Płyn Ringera 500ml	1	OP
Metronidazol 0.5 % inj 100 ml	80	ml
Cyclonamine inj. 2ml	4	ml
Propofol 1% wlew dożylny 5ampulek 20ml	15	ml
Tramal 100mg/2ml inj.	1,2	ml
Ostrze do skalpela 10	2	SZT.
Biohepanex Forte45kaps	30	kapsułki

Historia wizyt

Pole operacyjne 45x60 cm	1	SZT		
Rękawice Sterylne 6,5	1	szt		
RHEUMOCAM 2,5 MG TAB. 100TABL / MELOKSYKAM/			3	tabletki

 **ZALECENIA**

Od jutra proszę podawać Rheumocam 2,5 mg 1 x dziennie rano lub do południa 1 tabletką po jedzeniu przez 3 dni.

Od jutra normalnie jedzenie, miękkie.

Od jutra także biohepanex forte - 2 kapsułki 1 x dziennie przez 5 dni, potem do końca blistrów 1 kapsułka 1 x dziennie.

Jedzenie nadal rozdrobnione nawet może być półpłynne.

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

Podpis lekarza weterynarii